

[Omita y vaya al Contenido](#)


MedlinePlus
Información de Salud para Usted



Un servicio de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA
y los INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

[Buscar](#) [Sobre MedlinePlus](#) | [Índice](#) | [FAQs](#) | [Contáctenos](#)

[English](#)

REUTERS 
HEALTH INFORMATION

Consumir aspirina reduce el riesgo de cáncer de colon en hombres

 Versión para imprimir  Envíelo a un amigo

Traducido del inglés: *miércoles*, 13 de febrero, 2008

NUEVA YORK (Reuters Health) - Los hombres que toman aspirina habitualmente serían menos propensos a desarrollar cáncer colorrectal, según indicó un nuevo estudio.

Pero este beneficio exige una dosis más alta que la recomendada para la salud cardíaca y el consumo debe prolongarse por lo menos durante seis años.

"Existe pocos datos de largo plazo sobre el riesgo de cáncer colorrectal según la dosis, la duración y la consistencia de la terapia con aspirina", escribió en la revista *Gastroenterology* el equipo dirigido por el doctor Andrew T. Chan, del Hospital General de Massachusetts.

El equipo reunió datos durante dos años de más de 47.000 hombres sobre el consumo de aspirina y los factores de riesgo del cáncer. Los participantes tenían entre 40 y 87 años al ingresar en el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud, en 1986.

Se registraron 975 casos de cáncer colorrectal durante los 18 años del estudio.

Tras considerar los factores de riesgo, los hombres que tomaban aspirina habitualmente (por lo menos dos veces por semana) tenían un 21 por ciento menos riesgo de desarrollar un tumor colorrectal que los que no usaban aspirina con frecuencia.

En los varones que habían consumido aspirina con regularidad durante cinco años o menos, no disminuyó el riesgo de cáncer colorrectal. Y tras suspender la aspirina, la reducción del riesgo había desaparecido cuatro años más tarde.

El beneficio del consumo de aspirina estuvo relacionado con la dosis utilizada. Según los autores, los hombres que usaron hasta una unidad y media de la aspirina estándar de 325 miligramos por semana no mostraron una reducción significativa del riesgo de sufrir cáncer colorrectal.

Por otro lado, los que tomaron entre seis y 14 aspirinas por semana tuvieron un 28 por ciento menos de riesgo de cáncer colorrectal, mientras que esta reducción llegó al 70 por ciento entre los que consumían más de 14 aspirinas.

Para los investigadores, el próximo paso debería ser analizar los riesgos y los beneficios potenciales, además de la dosis óptima.

FUENTE: *Gastroenterology*, enero del 2008

Reuters Health

(c) Reuters 2008. All rights reserved. Republication or redistribution of Reuters content, including by caching, framing or similar means, is

expressly prohibited without the prior written consent of Reuters. Reuters and the Reuters sphere logo are registered trademarks and trademarks of the Reuters group of companies around the world.

Noticias relacionadas:

- [Más noticias sobre Analgésicos](#)
- [Más noticias sobre Cáncer del colon y del recto](#)

[Más noticias desde esta fecha](#)

Temas relacionadas:

- [Analgésicos](#)
- [Cáncer del colon y del recto](#)

[Página Principal](#) | [Temas de Salud](#) | [Medicinas y Suplementos](#) | [Enciclopedia](#) | [Tutoriales Interactivos](#) | [Noticias](#)

[Derechos reservados](#) | [Política de privacidad](#) | [Accesibilidad](#) | [Criterios de calidad para recopilar información](#)

[U.S. National Library of Medicine](#), 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894
[National Institutes of Health](#) | [Department of Health & Human Services](#)

Página actualizada: 14 febrero
2008