

[Imprima esta página](#)[Cierre esta ventana](#)

Radioterapia antes de cirugía mejora tratamiento cáncer rectal

Dirección de esta página: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_81441.html (*Estas noticias no estarán disponibles después del 04/06/2009)



Traducido del inglés: *viernes*, 6 de marzo, 2009

LONDRES (Reuters) - La radioterapia antes de la cirugía es una forma más efectiva de tratar el cáncer rectal en las personas con un tipo operable de la enfermedad, informaron el viernes investigadores británicos.

El tratamiento estándar que implica primero intervenir quirúrgicamente al paciente incrementa el riesgo de recurrencia tumoral en el recto, que es más difícil de tratar, según un estudio publicado en la revista The Lancet.

Robert Steele, del Hospital Ninewells en Escocia, y sus colegas demostraron que después de tres años las tasas de recurrencia de los tumores en los pacientes tratados con radioterapia antes de la cirugía eran del 4,4 por ciento.

Eso, comparado con alrededor del 11 por ciento registrado entre los pacientes que primero se habían sometido a la operación de remoción del cáncer.

(c) Reuters 2009. All rights reserved. Republication or redistribution of Reuters content, including by caching, framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Reuters. Reuters and the Reuters sphere logo are registered trademarks and trademarks of the Reuters group of companies around the world.

Temas relacionados:

- Cáncer del colon y del recto - <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/colorectalcancer.html>
- Radioterapia - <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/radiationtherapy.html>

Página actualizada: 09 marzo 2009